



PENTALOSINA 200
ANTIBIÓTICO CONTRA GRAM POSITIVOS
SOLUCIÓN INYECTABLE

FÓRMULA

Cada mL contiene:	
Tilosina base.....	200 mg
Vehículos c.s.p.....	1 mL

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La dosis recomendada para bovinos, porcinos y caprinos es de 1 mL de **Pentalosina 200**, por cada 20 kg (44 Lb) de peso vivo del animal, administrados por vía intramuscular o subcutánea, cada 24 horas por 3 a 5 días.

Programa preventivo recomendado en cerdos para el control de “Neumonía Enzoótica”, causada por *Mycoplasma hyopneumoniae* y su asociación con *Pasteurella multocida*.

CERDITOS (LECHONES)	DOSIS
A los 9 días de edad	0.25 mL
A la castración (10 días)	0.50 mL
Al destete	1.00 mL
CERDA	DOSIS
En el momento del parto	1 mL por cada 20 kg (44 lb)

PROPIEDADES

Pentalosina 200, es un antibiótico que tiene un espectro antibacteriano contra bacterias Gram-positivas, además es activo contra ciertas Spiroquetas, virus grandes, algunos microorganismos Gram-Negativos (no incluye coliformes). Es altamente efectivo contra mycoplasmas.



PENTALOSINA 200
ANTIBIÓTICO CONTRA GRAM POSITIVOS
SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES

Bovinos: Pentalosina 200 está indicada para el tratamiento de neumonías asociadas con *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes* y mastitis aguda causada por *Streptococcus sp.* y *Staphylococcus sp.*, Metritis causada por, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacteroides spp.* *Pseudomonas sp*, *Proteus sp*, *Clostridium sp.* y *Escherichia coli*. Pododermatitis o gabarro causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus* y difteria de terneros causada por *F. necrophorum*.

Porcinos: Está indicada para el tratamiento de artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus spp.*; neumonía causada por *Erysipelotrix rhusiopathiae* y disentería asociada con *Treponema hyodysenteriae* cuando se complementa con el tratamiento adecuado en agua de bebida o el alimento.

Ovinos y Caprinos: Pentalosina 200, está indicada para el tratamiento de estados iniciales de formas agudas e hiperagudas de agalactia contagiosa causada por *Mycoplasma agalactiae* y pleuroneumonía caprina causada por *Mycoplasma mycoides var. capri*.

PRESENTACIONES

Frasco vial color ámbar de 10, 50 y 100 mL