



PENTANABOL FORTE
ESTEROIDE ANABÓLICO
FÓRMULA INYECTABLE

FÓRMULA

Cada mL contiene:	
Undecilenato de Boldenona	50 mg
Vehículo oleoso c.s.p.....	1 mL

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Se administra por vía intramuscular o subcutánea.

ESPECIE	DOSIS
Toros, Vacas	5 mL
Novillos	2.5 - 5 mL
Caballos	5 mL
Terberos y Terberas al destete	2.5 mL
Terberos y Terberas al destete	1.5 mL
Cerdos	1.5 mL
Lechones	0.5 mL

En novillos de engorde: Con el objeto de obtener máximos resultados, se recomienda administrar una dosis mensual durante el proceso de crecimiento y engorde, aplicando 0.5 a 1 mL por cada 100 lb de peso.

En perros: 0.5 mL por cada 11 lb de peso. Repetir a las 2 ó 4 semanas

PROPIEDADES

Pentanabol Forte, establece un balance nutricional positivo en el animal, almacenando más elementos energéticos (anabolismo), frente a los que ordinariamente se utilizan y desgastan en el mantenimiento de las funciones vitales, promoviendo la retención de Nitrógeno, Fósforo y Calcio, así como la síntesis de proteínas, incluyendo fibra muscular, proteína plasmática y eritrocítica. El conjunto de los efectos anteriores, provoca una mejora del apetito, del estado físico y por ende del crecimiento y la ganancia de peso.



PENTANABOL FORTE
ESTEROIDE ANABÓLICO
FÓRMULA INYECTABLE

INDICACIONES

Pentanabol Forte, está indicando como tratamiento de apoyo para favorecer la convalecencia después de procesos infecciosos, infestaciones parasitarias, intervenciones quirúrgicas y estado de post-parto.

En agotamiento, debilidad, caquexia (enflaquecimiento), inapetencia y trastornos de la vejez. En la producción de efecto anabólico y roborante orgánico general, ejerciendo estimulación del crecimiento y desarrollo corporal, traducido en ganancia de peso, dado principalmente por la mayor formación de masa muscular. En osteoporosis y coadyuvante del tratamiento de fracturas.

Para contrarrestar efectos catabólicos, causados principalmente por estados de estrés o tensión que provocan trastornos energéticos como el destete y transporte o por el uso reiterado de glucocorticoides, empleados principalmente como antiinflamatorios y anticetónicos.

PRESENTACIONES

Frasco vial color ámbar de 10, 50, 100, 250 y 500 mL